

Suppl/P

61699/P

LABOISSIERE



Digitized by the Internet Archive
in 2018 with funding from
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b30354146>

MEDICA

EAQUE THERAPEUTICA,
PROPOSITA

AB ILLUSTRISSIMO VIRO D.D.
FRANCISCO DE CHICOYNEAU
Regis Consiliario & Medico, nec, non in
Almâ Monspeliensium Medicorum Aca-
demiâ Professore Regio Anatomico, Bo-
tanico, Cancellario amplissimo, Judice
æquissimo, Horti Regii Monspeliensis
Præfecto, Regiæ Societatis Socio, & in
Supremâ Computorum subsidiorumve
Occitanix Curiâ Senatore integerrimo,

SUB HAC VERBORUM SERIE
AN

*Ad curandam Diabetem diversi generis .
Remedia sint adhibenda.*

Quam Deo - duce & Auspice, propugnabit
FRANCISCUS LABOISSIERE Varaniensis apud
Petracorios, Liberalium Artium Magister,
antiquus Universitatis Consiliarius, & jam-
dudum Medicinæ studiosus, in Augustissimo
Monspeliensi Apollinis Fano, die mensis
Maii 1720.

MONSPELII,

Apud VIDUAM HONORATI PECH, Regis & Uni-
versitatis Typographi. 1720.

DISPUTATIONI

PROFESSORES REGII

R. D. Joannes Bezac , *Decanus.*

R. D. Petrus Chirac , *Serenissimi Ducis
Aurelianensis Archiater.*

R. D. Antonius Deidier.

R. D. Petrus Rideux.

1833² R. D. Antonius Magnol.

R. D. Joannes Astruc , R. D. Chirac
Coadjutor.

R. D. Jacobus Chastelain.

R. D. Henricus Haguenot.

R. D. Jacobus Lazerme , R. D. Bezac
Coadjutor.

DOCTORES ORDINARII

M. Petrus Peyraud Puibornand.

M. Josephus Richard de Boutillier.

M. Joannes Martin.

M. Jacobus Pistoris.


M. Antonius Cairol.

M. Joannes Lion.









CELSISSIMO AC PRÆPOTENTI
PRINCIPI

DE CARENCEY

NICOLAO DE QUELEN
STUART DE CAUSSADE

Comiti de la Vauguyon , de Quelen ,
& du Broutey , Marchioni de Saint
Megrin , Vicecomiti de Calvignac,
Baroni de Thonneins, Grateloup,
Villeteau , Puicorner , La Gruere ,
Domino de Varaigne, l'Arnagol ,
Talquoymer , La Chesnaye, Pro-
vinciae Cadurcensis Baroni secundo,
Sarlati Advocato , &c.

P RINCEPS CELSISSIME,

*Quod rudis & novitius Artis Apol-
lineæ Cultor , tenues adeo Laborum Aca-*

demitorum pri
CELSITUDINI TUA, quod potentis-
simum ejus Patrocinium promereri me
posse confidenter sperem. Nullus haud-
dubiè mirabitur, qui sciet tot inter an-
tiquioris imò quoque Regiæ nobilitatis ti-
tulos, & illustriorum dignitatum vir-
tutumq; decora quibus præfulges, emi-
nere tamen singularem illam humanita-
tem, veramq; magnanimitatem quæ cu-
juscumque sortis mortalibus ad aram be-
nignitatis tuæ confugientibus, certum &
efficax præsidium denegari vel deesse mi-
nimè patiuntur.

Sed iterum meam in hoc ambiendo per-
illustri validissimoq; tutamine fiduciam,
multo minus adhuc mirabuntur, quicum-
que noverint ad illud obtinendum, non
magnas & iteratas preces, non exquisita
munera, non anxia repetitaq; vota de-
siderari, verùm unicam præsidii necessita-
tem semel cognitam sufficere, ut hoc in-
digentes authoritatis magnitudine, con-

fil. quod precipuum
est, si a. . . premanur inopia, largitioni-
bus Principe dignis protegas & adjuves.

Demum & eandem fiduciam minimè
temerariam, quin ex adversò legitimam
judicabunt, quilibet attendent humanissi-
mi nostri Principis charitatem & amorem
erga Clientes, tantarum esse virium, ut
eorum egestatem Ministrorum & interces-
sorum vocibus, aut supplicibus libellis ex-
poni nequaquam expectet. Verum in hac
ubicumque lateat detegenda, paternam
& indefessam curam adhibere non desinat,
quo possit eidem etiam illæso pudore, li-
beralitatis summaq; potestatis amplitudine
subvenire.

Humanitas ergò, magnanimitas, im-
mensaq; CELSITUDINIS TUÆ cha-
ritas erga Clientes, ad ejus tutelam in
hisce non parum arduis Laborum meorum
initiis confugiendi, magnam hanc dedere
fiduciam, quam insuper auxit penitusque
firmavit consideratio memorabilis hujus

erga Deum imm. 12
cum prœlaudatas inter virtutes principa-
tum teneat , earundemq; basis sit &
origo , vim harum inviolatam & inex-
haustam huc usque præstitit , præstabitq;
semper , cum ipsamet summa sit , & per-
manserit hætenus inconcussa , cum tot
hujus & adeo luculenta testimonia de-
deris , præsertim verò dum munificentia
religiosissimo Principe digna , publicum in
Urbe Thonneiana Religiosorum hominum
Conventum erigi , Fanumq; primarium
eiusdem Civitatis , Impiis Hæreticorum
furoribus incensum , & eversum propriis
impensis refici curavisti. Cum denique
Sanctissimam Salvatoris nostri Legem ,
non tantùm alta mente diu noctuq; re-
volvere , sed & illius sanctitatem im-
munem ab omni labe servare , verumq;
supremi numinis cultum propagare sem-
per studueris.

Nec mirum ; Divinam hanc virtutem
in nostro Principe sic splendescere , cum

eam auferit ex intimo sinu Parentum ,
& ad eandem ardentissimo colendam stu-
dio , potenter & assiduo commoveatur
exemplis Avorum clarissimorum , quos in-
ter sexdecim numerantur Equites nobilif-
simi , multò magis hujus eximie pietatis,
quam fortitudinis utut insignis claritudi-
ne percelebres , utpote qui Cœlestibus Spi-
ritus Divini flatibus impulsæ , vitam &
fortunas , ad extorquendas è manibus In-
fidelium terras , pretioso sacri nostri Re-
demptoris sanguine conspersas , ultimo dis-
crimini committere minime dubitarunt.

Cætera verò clarissimaq; virtutum or-
namenta , quibus à tot retro sæculis , ad
hanc usque diem , præcelsa Queleniorum
Domus semper enituit , quemadmodum &
ea quibus præter jam memorata , CELSI-
TUDO TUA condecoratur , rudem ad-
huc & inexpertum in dicendi facultate ,
venerabundo potiùs silentio suspicere de-
cet , & impense demirari , quam eloquii
simul & ingenii culpâ deterere , cum

aliundè sufficiat ad desideratum & soci-
nium confidenter non minùs ac suppliciter
ambiendum , & exorandum , humanissi-
mum piissimumq; Principem invenisse. Nec
mihi quidquam amplius peroptandum su-
persit , quam ut Laboribus indefessis , as-
siduisq; vigiliis , & præsertim humani-
tatis charitatisve Principis ad exemplum,
dum artem profitebor exercitio , CELSI-
TUDINIS TUÆ , tutela non indignus
aliquando possim evadere. Hæc summa
votorum est illius qui profundissima cum
veneratione gloriatur , semperq; gloria-
bitur esse ,

PRINCEPS POTENTISSIME ,
CELSITUDINIS TUÆ ,

Dabam Monf-
pelii die 26.
mensis Maii
anni 1720.

Observantissimus &
obsequentissimus Cliens
FRANCISCUS
LABOISSIERE.

QUÆSTIO MEDICA

EAQUE THERAPEUTICA,

AN

Diabeti diversi generis remedia competant.

*** ÆC. de Diabete, seu immoderato
 * **H** * celerique per vias urinarias serosi
 *** laticis fluxu Dissertatio, quibusdam
 haud dubiè nullæ vel exiguæ prorsus uti-
 litatis esse primâ fronte videbitur. Quòd
 id morbi genus rarum adeò sit in hisce
 regionibus, ut Seniores inter & experien-
 tissimos Æsculapii Proceres, paucos ad-
 modum liceat invenire, quibus semel, aut
 bis, illud in toto vitæ decursu videre &
 tractare contigerit. Verùm quandoquidem
 Hygeæ leges expostulant, ut illius sacris
 addicti, non tantum ad vulgares, sed &
 rariores affectus, occasione datâ, sanandos

A

certam seu salutarem opem con-
 leant : nullusque propèmodum Author,
 saltem alicujus notæ , reperiatur , qui , si
 tradat generalem morborum historiam , de
 Diabetis quoque naturâ , causis , signis &
 curatione non edisserat. Cum insuper va-
 ria quæ solidis & fluidis corporis humani
 partibus inferuntur malorum genera , sum-
 mam inter se ratione causarum , saltem
 evidentium , & consequenter indicationum
 & remediorum analogiam habeant , ut vix
 possibile sit exponi cujusdam morbi theo-
 riam , & curationem ; quin expeditior ad
 quam plures alios dignoscendos domandos-
 que via paretur. Denique cum fluxus Dia-
 beticus peregrinarum regionum ad Septen-
 trionem vergentium , Magnæque Britanniaë
 præsertim alumnos non infrequenter inva-
 dat : & horum multi seu Gallicæ gentis
 morum elegantia , seu aëris insigni potis-
 simum in hoc nostro tractu salubritate fruen-
 di causa , apud nos commeent , & aliquan-
 diu commorentur : quibus perinde lectissi-
 mis & nobilissimis , quoad maximam par-
 tem Hospitibus , subortâ necessitate , se-
 cundum humanitatis leges pro virili suc-
 currendum ; his omnibus , inquam , ratio-
 num momentis incitati , quælibet ad mor-

bi . . . norati notionem & curam spectant,
exponere decrevimus. In quo quidem exe-
quendo proposito, cum ob affectûs rari-
tatem propriis observationibus uti prohi-
beamur, Authorum scientiâ & experien-
tiâ celebrium, summâque fide dignorum;
quibus nimirum hac in parte feliciores esse
contigit, opera diligenter evolvimus; ac-
curatas quæ ab ipsis proponuntur Diabe-
ticorum historias iterum, atque iterum at-
tentâ mente legentes; ut ex his omnibus
sedulò collatis viribusque meditationis re-
petitæ probè digestis, perfectam fluxus adeo
stupendi eidemque medendi notitiam conse-
qui, tum & acquisitam omnium oculis &
examini subicere liceret.

Cum autem unanimi consensu Diabetis
essentia posita sit in eo quod serofus latex
assiduo, miraue prorsus cum abundantia,
tum & celeritate per urethram exeat, sic ut
potulenta quælibet avidissimè sumpta, si-
mul & ea quæ generantur aut cumulan-
tur in vasis fluida, brevissimo temporis in-
tervallo, quodque maxime notandum, vix
cocta mutataque reddantur. Necessarium
idcirco fore duximus, antequam historia
morbi proponatur juxtâ methodum in hoc
lycæo receptam, hîc paucis & accurate

tamen perpendere, num ad hujusmodi
 deratæ promptæque secretionis & excre-
 tionis rationem reddendam, cum CARTESII
 discipulis, aliisque permultis inter Neo-
 tericos, tum doctrinâ, tum autoritate pol-
 lentibus supponendum sit aliam à naturâ
 providâ longeque breviorē, cognito cir-
 culationis itinere, viam paratam esse, cu-
 jus ope nimirum, quælibet ore sumpta si-
 mul & in vasis exundantia liquida possint
 ad renes, & vesicam urinariam velociter
 appellere, & consequenter sine morâ per
 urethram excerni. Si namque totus quam
 longè latèque patet circulationis orbis ite-
 rum atque iterum à potulentorum rivulis
 sit percurrendus, antequam pervenerint
 ad urinæ conceptaculum, sicque per in-
 numeros penè mirèque flexuosos & intor-
 tos vasorum furculos diffundi debeant; &
 repetitis tum solidorum ictibus, tum mo-
 tibus fluidorum, ad intimam cum cæteris
 universæ massæ particulis unionem adigi;
 certè patet evidenter, his suppositis, nec
 explicari, nec intelligi posse quâ fiat, ut
 mineralium aquarum potatores, & Dia-
 betici, tot liquidi ferè prorsus immutati,
 vel subdulcis seu insipidi rivulos quam ci-
 tissimè valeant emittere.

5

Hinc itaque plurimis, iisque clarissimis Hygeæ cultoribus occasio data, novam eamque breviorē viam excogitandi, cuius ratione potulenta, vel latex aqueus celeriter ad vesicam appellantur, & eorumdem miscela eum *Simul* præpediatur. Statuunt etiam ~~in~~ ventriculi, & intestinorum si ~~in~~ meos, ut si fortassis laxentur ab exundantibus aquis, vel caloris intensi viribus dilatentur, easdem aquas propter æstus vehementiam in effluvia resolutas per hosce meatus illicò traduci: unde brevissimum iter ad vesicam ostenditur, cuius pori rursū supponuntur ita concinnati, ut nubem effluviorum accedentem in illius conceptaculi cavum admittant; ubi denuò condensata, & in aqueum laticem conversa confestim per urethram effunditur. In eundem pariter scopum collimat sententia statuentium quosdam ductus à fundo ventriculi per Epiploon ad vesicam, vel à lacteis ad renes tendere: quibus videlicet ob causas supra memoratas distentis & reſeratis potulenta secundum omnem sui massam celerius transmittuntur.

Verū post attentum, & sedulum huius hypotheseos, & rationum quibus nititur examen, tot & adeò gravibus ne di-

cam insuperabilibus difficultatibus patentem introspeximus, ut nobis minimè licuerit calculum huic adjicere, quin potius refellendam censuimus, vel ex eo potissimum quod absque hoc subsidario, fictitioque pororum & novorum ductuum apparatu, nec aliunde maximo cum labore possit explicari, quâ ratione certis in casibus fiat interim adeo velox & copiosa liquidorum per vias naturæ familiares secretio, simul & illa multiplicem vasorum orbem peragrarè queant, quin cum reliquis totius massæ particulis intimè miscantur. Et ut statim ad rem, seu ad argumenta quibus opinio memorata convellitur, accedamus; Hæc inter cætera summam moerentur attentionem.

I. Si ductus secretorii renum, pelvis, aut ureteres, vel à calculo, vel ab arenulis, vel à materiebus viscidis & tartareis penitus obstruantur, vel magnæ cujusdam inflammationis viribus, seu alio quovis insigni tumoris genere comprimantur, sic ut assueto muneri fungi nequeant. Tum (& illud probe notandum) ex toto prorsus intercipitur urinæ fluxus, nec subinde licet in vasis cumulata, & interdum in ventriculi cavum effusa, nec utcumque li-

quida diversi generis hauriantur avidè , iisdemque mirum in modum stomachus , & intestina turgeant : etsi tandem , nec liquor ad laxandos meatus suppositos deficiat , nec calor ad eosdem dilatandos : neque demum æstus intensus desideretur , quorum ope potulentorum materies in effluvia resolvi, resolutaque traduci possit. In hoc tamen rerum statu ; Nec urina reddi , nec miseri ægrotantes ab imminente perniciæ valent liberari. Unde consequentiam , luce meridiana , clariorem quivis eliciet , renes non modo præcipuum , sed & unicum urinæ colum esse , cum ubi cessant ab hoc implendo munere , nulla pars alia corporis humani eorundem vicem obire possit.

II. Alterum argumentum adversus præfatam hypothesein petitur , ex eo quod hujuscemodi sive pori , sive ductus nullo experimenti genere potuerint adhuc-dum demonstrari , licet omne prorsus artificium à viris industriis , & in Anatome versatis , ad hosce detegendos fuerit adhibitum ; & hi verò similiter in conspectum venire debuissent , saltem in statu præternaturali ; dum ex suppositis impensè dilatati plures aquarum rivulos in Diabeticis nimirum Hydropicis , & aquarum mineralium pota-

toribus jugiter traduxerunt. Cum itaque nullum horumce meatuum vestigium hactenus apparuerit, vasaque à BARTHOLINO, aliisque allegata, vera sint lymphatica, maxima subnascitur ratio de eorundem existentia dubitandi.

III. Novus hic secretionis ritus naturæ legibus, seu mechanismo quem supremus machinæ Conditor ad cæteras omnes secretiones sensibiles stabilivit, penitus adversatur, & aliundè suum urinæ, sicut reliquis recrementis miræque prorsus elaboratum arte colum concessum fuit, quod ex infinitis penè vesiculis & ductibus conflatum ad immensam aquarum molem assiduò celeriterque traducendam comparatum est, posito quod à fonte perenni jugiter suggeratur; ut perinde labor qui novis meatibus inveniendis & comminiscendis impenditur, superfluous planè, nostro quidem judicio, debeat reputari.

IV. Si tunicæ quibus constat conceptaculum urinæ sint instructæ poris foris introspectantibus, jure quæritur, cur Asciticorum aquæ collectæ intra cavum abdominis, & consequenter hujusmodi poris immediatè appositæ, per hos tamen minime traducantur, utcumque laxari de-

beant à liquidis stagnantibus, vel caloris intensi viribus dilatari. Demùm & aquea prætermodum, excalefacta possint in effluvia resolvi, quarum nempe causarum concursu similes effectus in ventriculo produci supponunt: imo quò major in infimo ventre congeritur feri copia, quò vehementior æstus urget, quò denique materies vaporum abundantior, eò difficilius hæc ferosi laticis colluvies expurgatur; nec Hydropis sanationem licet sperare, nisi referentur intestinorum aut renum ductus. De quo aliunde morbi genere notandum obiter, multò frequentius solito, miseros mortales invasurum, si ventriculus juxta supposita pervius foret meatibus aptis ad transmittenda liquida, cum ob ingluviem, heu nimis familiarem? hosce poros summo perè distendi sæpiùs accideret.

V. Secundùm memoratam de poris & vaporibus in aquam convertendis hypothesim, vix, imò nullatenùs intelligi potest quâ ratione ferusus latex aut potulentorum materies celerius, abundantius, & immutata secernantur, cum ex adverso multò minori copiâ, multò tardius, multoque magis ab ingestis liquidis discrepantia debeant emitti, quam ubi per consuetum

circulationis iter ad renes appellant.

1°. Quoniam ab effluviis in aqueum humorem convertendis non modo pori ventriculi & vesicæ ; verum etiam omnium partium interjectarum implentium cavitationem abdominis, & se mutuò contingentium permeandi sunt.

2°. Insigne temporis spatium desideratur , utut intense caleant ventriculus & intestina , quo tota liquidorum ingesta moles resolvatur in vapores : ut cuilibet inferendum datur, ex cognitis & quotidianis aquarum diversi generis destillationibus.

3°. Qui vapores ex incalescente liquido jugiter, secedunt , multò liberius superiora ventriculi petunt quam ejus fundum, aut moventur in omnem sensum , ut perindè minima prorsus eorundem portio versùs inferiora traducenda sit.

4°. Non minùs evidens est exilem hanc effluviorum nubem quæ ventriculi poros permeavit à plurimis obicibus occurrentibus, seu partium molibus interjectis ubique in suo cursu retardari , coerceri : sic ut & ab effluviis ex-aliorum viscerum poris assiduò manantibus hûc & illûc in omnem loci differentiam impelli. Demùm & ab humido quo partium memoratarum super-

ficies oblinitur quoad maximam sui partem absorberi debeant, ita ut tardissimè nec nisi post summam particularum ex quibus memorata nubes coalescebat jacturam, ad conceptaculum urinæ tandem valeat pervenire; ubi rursus aliud illudque longissimum temporis spatium requiritur, ut transmissi vapores denuò convertantur in aqueum humorem, dato tamen, non concesso quod interaneus viscerum & vesicæ calor, hujusmodi conversionem seu condensationem fieri permittat.

5°. Demùm & ultimò necessariò sequitur ex ante dictis, hæc eadem effluvia priusquam intra vesicæ sinum admittantur, mirum in modum in transitu per cavum abdominis ab aliis omnis generis effluviis undique advenientibus alteranda: ita ut à connubio vaporum biliosorum, fœculentorum, acrium, acidorum, falsorum, non possint non impensè mutari.

Et hæc quidem præcipua sunt rationum & experimentorum momenta, quibus ad præfatam hypothesim refellendam inducti, sic eam expugnata arbitramur, ut nullum aliud CARTESII discipulis effugium superesse possit, quam ut statuant celerem & copiosam liquidorum per vias urinarias ex-

cretionem adscribendam esse ductibus à fundo ventriculi ad renes aut vesicam rectà protensis, & serosum laticem immutatum traducentibus.

Verum præter-quam quod novum illud suppositum mechanismo secretionum hactenus cognito, juxta superiùs allata repugnat, nullaque prorsus nititur demonstratione. Accedit aliundè totum hunc seu meatuum seu pororum apparatus omninò superfluum & inutilem esse; cum etsi potulenta vasa sanguifera subingrediantur eorundemque percurrant orbitam summâ tamen cum copiâ & celeritate secerni, nec non parum à seipsis ingestis discrepantia dimitti possint.

Id autem ut evidenter pateat tantisper velim attendi, quod dum more solito portantur aquæ minerales, aut Diabeticus fluxus supervenit, tum, inquam, omnia quæ requiruntur ex parte fluidorum & solidorum ad copiosam & celerrimam secretionem simul concurrere; quæ quidem quatuor numero possunt censerì, ad quæ tamquam ad præcipua capita reducuntur.

Nimirum constat 1°. Magnam in memoratis casibus liquidorum ad hujusmodi secretionem idoneorum ubertatem intra

vasa reperiri. 2°. Hæc eadem liquida à reliquorum totius massæ principiorum compedibus esse libera, seu extricata. 3°. Fluxum eorundem assiduum, celerem & copiosum ad incernicula renalia jugiter promoveri. 4°. Denique ductus secretorios renum sic esse dispositos, ut fluidum indefinenter & celeriter appellens statim, seu absque vel minimâ morulâ secernant.

Quoad primum requisitum, insignem videlicet liquidorum ad secretionem idoneorum ubertatem, eam in præfatis casibus reperiri quis inficiabitur, nam & avidè, copiosè, liberaliter & assiduò bibitur, subindeque cruda prorsus & incocta liquida debent in vasis luxuriare: sic ut omnis propemodum humorum aggeries summopere diluta in laticem aqueum convertatur, aut indolem acquirat huic plurimum analogam; nec minus ingenuè fatendum est ea quæ affatim ingeruntur potulenta, toti massæ supernatare, vel serum illud quod in sanguine luxuriat & particularum ejus sinibus immersum ope dissolutionis aut coagulationis elici, seu extricari; perindeque sui juris factum, esseque paratum ad secretionem. Primum ergò secundumque propositum ulteriori probatione non indigent.

Tertium verò quod attinet in eo demonstrando juvat diutius immorari, cum celeritas & abundantia secretionis ex eo præsertim perenni, continuo rapidoque fluxu liquidorum versùs incernicula vasaque renalia pendere videantur.

Sed si potulenta copiosè, liberaliter & affatim ingerantur, vel si latex aqueus prætermodum abundet, etsi tandem hæc fluida libera sint, seu à compedibus sulphurearum & terrestrium particulatum soluta, sicque vasa sero fluidissimo & expedito turgent, motum humorum in orbe circulationis celeriores continuūque futurum evidens est. Tum & ex copiâ liquidorum implentium vasa, unus & veluti continuus aquæ rivus ab eorundem initio ad extremos usque furculos scaturiet, cujus primæ in origine & subsequentes in progressu particule non poterunt impelli motibus iteratis cordis & arteriarum, quin ejusdem fluenti finis & ultimæ moleculæ propter contiguitatem pari ritu moveantur. Deinde luxuriantes assiduoque suggestæ liquidorum particule sese mutuò trudent, urgebuntque presso pede, perindeque motûs trusivi viribus auctis universa massa celerius circumducetur, tantoque facilius si serosus latex

ex connubio cum reliquis illius principiis sit expeditus. Sed & iterum ab eodem exundante liquido tota moles humorum fluidior reddita multò rapidiùs peragrabit vasorum orbem; hinc frequens iisdem vasis & indefinens admovebitur stimulus, quo cum ad assiduas, crebras, alternasque contractiones adigantur, rivulos aquarum transeuntes quolibet instanti verberari, urgeri, sicque motum trusivum intendi ulteriùs subsequetur, ut tandem nemini mirum videri debeat, si tot causis in unum eundemque finem conspirantibus, continuus & celerrimus fiat ad cola fluidorum appulsus.

At præter hæc omnia rationum momenta, quæ probant evidenter fluida velociter in casibus assignatis debere circumduci. Advertendum insuper quoad potum aquarum mineralium, earumdemque promptam excretionem, matutinum diei tempus ad huiusmodi potum destinatum, & earumdem aquarum frigiditatem, ad augendam motûs liquidorum velocitatem, symbolum suum conferre. Quæ si quidem primo diluculo potantur aquæ celeriùs ideo per vasorum orbem traducuntur. Quoniam in eo quod à vespertinâ cœnâ ad auroram exactum est temporis spatium, quæ fuerunt ultimò sump-

ta ciborum fercula , jam in sanguinem conversa sunt , aut esse debent : perindeque motuum intestinorum ad coctiones & secretiones inservientium vires resederunt; unde fit ut advenientium aquarum rivuli minimè cum cæteris humorum massæ particulis misceantur , sed tantum supernatent , tantoque faciliùs , quod eadem aquæ hauriantur absque ulla miscela ciborum solidorum , nec consequenter ab iis intricari , nec in ventriculo , nec in intestinis , nec in lacteis aliisque vasis circulatoriis retineri queant , nisi fortassis adsit saburra quædam & plethora quæ trajetum impediat. Verum huic occurritur impedimento , catharticis juxta leges artis præmittendis, quorum ope , cum vasa jam depleta sint , liberior & patentior advenienti liquido via sterni debet : quibus insuper addendum est primâ diei luce propter aërem frigidiores poros perspirationis per hosce meatus exire solitæ quadantenus occludi , subinde fluidorum in vasis contentorum molem augeri. Demum & à constricto corporis habitu , sic interanea premi ut liquidorum velocitas intendatur.

Et idcirco dicimus secundò frigiditatem aquarum mineralium , serosum laticem copiosius

copiosius & celerius ad cola determinare, quoniam partium quas alluunt internarum poros constringendo, halituum ex his manantium excretionem cohibet, sicque con-
similes effectus parit jam memoratis; & revera si calidæ potentur aquæ major per incernicula cutis, minor verò per ductus renales fit secretio. Accedit insuper frigiditatis viribus & aquarum ingestorum mobilibus fluidorum occurrentium motum expansivum deprimi, sic humoris aquei cum sanguine miscelam prohiberi; quo fit ut fluenti rectà progredientis cursus turbari nequeat.

Quæ quidem hætenus dicta satis superque sufficient, ut evincatur velocitatem motûs liquidorum in casibus memoratis causarum assignatarum concursu promovendam; necdum tamen solvimus præcipuum difficultatis nodum, cum etsi moles aquea, vel incocta celerius ex suppositis impellatur, non ideò subsequatur ad renes potius quam ad cætera cola determinari: si namque fluida per innumeros propè vasorum sanguineorum, lymphaticorum & secretoriorum diremptus traduci & consequenter in totidem columnas dividi debeant, quot sunt canalium in humano corpore diverticula,

patet evidenter , quòd utcumque rapidissimo motu ciantur , tardè tamen , non autem celeriter ad renes sint perventura ; ut perinde nobis illud oneris jam incumbat , ut probetur liquidum actum summâ cum celeritate ferè totum ad renes , non autem ad cætera cola divertere.

Et ideò rursùs statuendum est magnam seu immoderatam liquidorum per urinas excretionem numquam accidere , nisi hæc duo præsertim concurrant , nimirum & abundantia liquidi apti ad secretionem , & ductuum secernentium , ut & excernentium amplitudo.

Sed si liquidum aptum ad secretionem redundet , vel succorum incoctorum proventus fiat uberior , necessariò sequitur aliorum recrementorum copiam & vires imminuenda , mox ex defectu roboris & quantitatis eorundem , continget , ut minùs uberim & lentius ad sua quæque ferantur incernicula ; quæ proinde solito minùs dilatari rariùs & remissiùs ad secretionem stimulari debent. Dum verò ductus secretorii solito minùs distenduntur , rariùsque defunguntur muneri destinato , minorem iterum quorumlibet fluidorum penum admittunt ; undè fit ut eorundem diameter evadat an-

gustior : quâ quidem angustia sensim in dies auctâ , cum causa à quâ producitur semper præsens sit , & novum assiduò sumat incrementum. Tandem vasorum secretoriorum cavitates & ingressus ferè penitus occlud necessum est. Ex clausis autem infinitis penè meatibus innumera quoque excitabuntur resistentiæ , quibus advenientia liquida repellentur ; ità ut versus loca libera , seu ad patentes & jam ampliatos ab exundante liquido ductus renales cogantur divertere. Nam sicut ex penuria aliorum recrementorum ductus eorundem secretioni destinatos angustari sequitur , sic ex adverso , propter abundantiam liquidi , crudi & incocti renum incernicula debent reserari , seu in continuâ detineri dilatatione , quem admodum & humor analogus quo imbuuntur ubertim & assiduò renovari , perindèque renes ad uberiore disponi secretiones. Sicque , juxta leges hydraulicas , mechanicè demonstratur , quod tota penè quanta est liquidorum moles ad hoc incerniculum appellere , & quidem per illud celerrimè scerni debeat. Cum ubi juxta superiùs statuta , tot meatus occluduntur , solique propemodùm ii patent qui pertinent ad renes , circulationis orbita multò subindè brevior

evadat , & exiguo prorsùs temporis intervallo sit percurrenta.

Sicque tandem omnibus supra requisitis , ad immoderatam celeremque potulentorum & ferosi laticis crudi ac incocti excretionem abundè satisfactum existimantes , absque eo quod via quædam singularis extra circulationis orbem supponatur. Alias consequentias quæ ex principiis superius expositis à lectore perspicaci, sat facilè deduci possunt , omittendas censuimus , ne thesis crescat in immensum.

Verùm dato , non concessò , quod juxtà supposita nequeat adhucdùm intelligi, quo pacto tantâ cum velocitate simul & abundantia , potulenta , vel liquida cruda & incocta reddantur : non ideò quærendum foret & supponendum breve quoddam & distinctum à semitis circulationis iter ad hujusmodi Phænomenon dilucidius explicandum ; cum quotidianâ constet experientiâ contentos & assiduò fluentes in vasis sanguiferis humores aqueos singulari quodam motûs genere excitato , simul & prætermodùm dilatatis secretoriis quibusdam ductibus, abundanter , celeriter & indefinenter eliminari.

Quarum videlicet secretionum & excre-

tionum exempla familiaria suppeditant innumerae propè crifes aut evacuationes, in morbis præsertim acutis, seu spontè, seu ope remediorum, seu quibuscumque aliis de causis evenientes, & quæ semel excitatæ per insignè temporis spatium uberrimè, celerimè & assiduò perseverant. Sic ubi propter assumptum vehemens quoddam Catharticum, aut fermentum quoddam acre tunicis intestinorum impactum, potenter vellicantur intestinorum tunicæ: perindèque serum in vasis contentum, & expeditum ad eorum glandulas continuò determinatur, tùm, inquam, celeres, constantes & immodicas ejusdem serosi laticis per alvum excretiones fieri conspiciamus; sic iterùm ubi caloris cujusdam intensi viribus, vel ob summam acredinem humorum in febribus malignis, & ardentibus, funditur sanguis, serumque per fusionem extricatum ad dilatata cutis secretoria amandatur, totum illud humoris aquei quod continetur in vasis, aut ab assiduò potu suggeritur, indefinenter, abundanter & celeriter per habitûs exterioris spiracula exire cernimus. Sicque tandem ubi per introductos Mercurii globulos solvitur nexus particularum sanguinem constituentium, & fit uberior serosi laticis ge-

nesis, simul & dilatantur vasa salivaria, hîc idem humor uberrimè & continuò per ductus referatos fluit & excernitur, ut si fortassis majori quam par sit dosi vel unguentum Mercuriale, vel panacæa quævis administrata fuerint, tota quanta est massa colliquata, seu in serosum laticem conversa, per hanc viam intra breve temporis spatium possit exinaniri.

Ex quibus patet evidenter omnia fluida, quæ tantâ cum ubertate & assiduò seceruntur, in vasis circulatoriis contineri, & ab iisdem suggeri. Nec mirum cum ductus omnes, tùm circulatorii, tùm secretorii, & consequenter humores in his jugiter agitati, fluentesque, sic inter se communicent, ut quâ proportionè vasa quædam deplentur, hâc eâdem impleantur cætera: & vice-versa quò plùs sanguinis, spirituum & aliorum fluidorum quædam ex his admittunt, eò minùs eorundem alia recipiant; quæ quidem propter liquidorum & solidorum continuitatem momento temporis, simpliciter ob immutatas motuum determinationes ita debent accidere.

Sed de his satis cum hætenùs dicta, nostro quidem iudicio, sufficiant, ad demonstrandum poros & ductus peculiare,

seu diversos à cognitis , ad potulenta celeriter traducenda esse prorsus inutiles. Nec est aliundè cur immoremur diutiùs in explicando quo pacto absque eorumdem ductuum suppositione liquida quævis licet semitas circulationis subingressa rejiciantur immutata. Si namque, propter allegata rationum momenta , nec in ventriculo , nec in intestinis , nec in vasis sanguiferis commorentur , imò potius præter-fluant celerimè, si brevissimum insuper itineris spatium in orbe circulatorio percurrant; et si tandem ob aquarum exundantium molem aut frigiditatem occurrentium fluidorum motûs intestini deprimantur , sicque fermentorum immutantium deficiat energia : ex his , inquam , omnibus haud difficulter intelligitur , quibus de causis potulenta , vel alia liquida rejiciantur immutata.

His ita prælibatis , quæ non mediocrem ad essentiam fluxûs Diabetici dignoscendam lucem afferent. Jam ad illius affectûs historiam juxta receptam methodum exarandam progredi juvat.

COROLLARIUM PRIMUM
De Natura , & differentiis Fluxûs Diabetici.

Diabetes, seu Hydrops ad matulam vulgò definitur , aut potius describitur

immoderatus , celer , & frequens urinæ fluxus , in quo nimirum fluidum illud coctionis expers & insipidum , interdùmque mellei saporis , seu subdulcis , & quandoque coloris albicantis particeps esse videtur : qui quidem fluxus sitim intensam , viscerum æstum & febriculam habet adjuncta ; eodemque ad certum usque gradum provecto , brevi temporis spatio siccitas , marcor , verbo , partium omnium & præsertim universi corporis habitûs colliquatio , debilitas & exarescentia succedunt.

Verùm quo clariùs & accuratiùs raræ prorsùs affectionis indoles dignoscatur , illius initia , progressum & finem juxta descriptionem ARETÆI , veteres inter percelebris , seu secundum varios quos in diversis sui stadiis exhibet vehementiæ gradus , sic paucis lubet exponere.

Ubi morbus est in procinctu , solitòque copiosius urina fluit , oris interiora , fauces , & palatum humoris assueti penu defraudata , sensim exarescunt , & si quæ fortassis suggeritur saliva , hæc quemadmodum in sitibundis spumescit & albicat ; subindèque sitis , seu major liquidorum oritur appetitus , exin , ubi crescente malo , quantitas uberior urinæ funditur , bibendi cu-

piditas urget potentiùs. Calor quidam acris, velut impactus visceribus, perſentitur, & tùm corrugatur abdomen, venæ prominent, corporis habitus univerſus evadit gracilior: unde timor & anxietas, mentem novorum ſymptomatum conſideratione vehementer attonitam invadunt. Affiduò namque moleſtoque faucium & interaneorum ardore divexatus æger, ſimul & ob exeuntis præproperè liquidi diluvium ſtupens, ex æquo metuit, ne tota quanta eſt liquidorum & ſolidorum moles, in ſeroſum ſolvatur laticem. Et reverà, dum liquidum promptiùs, frequentiùs & immoderatiùs excernitur, non modò corporis habitus, ſed & ipſæmet carnoſæ partes liquantur, & contabescunt, tùmque poſtremum impendet fatum, nec enim intermittit urinæ fluxus, ſed affiduò velut è canalibus omnimodè laxatis & patentibus eliminatur, cum intentiſſimâ, ſeu deurente ſiti, ſubindèque largiori potu, cujus tamen copia minimè reſpondet urinæ quantitati: cum liquida multò copioſiùs per urethram egerantur, quàm ingerantur ore, verbo, nec à potu, nec à mictione ceſſant, & ſi fortaiſſis abſtineant tantisper à potulentis, non in dies tantùm, ſed & in horas, os, & corpus

sensibiliter exarescunt , cunctaque viscera torrentur , velut ignibus admotis. Denique si per exiguum temporis spatium mictum cohibeant , illicò tument lumbi , testes , & ilia , moxque reddita meiendi libertate , partes eadem detumescunt , & tùm promptior adhuc , & certior imminet perniciēs , nam ne vel minima liquidorum guttula nutriendis partibus communicatur , quin potius ipsæmet carnes in liquamen quoddam urinosum videntur abire.

Sed hæc omnia , tùm ab ARETÆO , tùm ab aliis Observatoribus fide dignissimis , diligenter in variis Diabetici fluxûs stadiis animadversa , nec eundem in diversis subiectis vehementiæ gradum , nec omninò similem exhibent ubique characterem , præsertim si lotii quantitas & indoles attentè considerentur ; undè proculdubio manavit ea quæ à non-nullis circumfertur divisio Diabetis in veram , seu legitimam , & falsam , seu spuriam. Veram esse dicunt , cum immoderatiùs , promptiùs & frequentius exit urina , sed ea copia quæ par sit assumptis , & quoad qualitatem , saporis expers , incocta , vixque mutata ; aliundè cum siti , calore & siccitate , non admodum intensè sævientibus. Falsam verò

Diabetem statuunt , ubi funditur lotium adeò copiosè , ut ingestorum molem longè superet , quodque præterea solitò spissius , subdulcis aut mellei saporis , & coloris ut plurimum albicantis particeps , sitim deurentem , febrem lentam , summam virium debilitatem & marcorem horrendum habet adjuncta vel pedissequa.

Nùm verò posterior hæc species veluti gradus prioris debeat considerari , sic ut in eodem subjecto , & in variis ejusdem morbi stadiis , tùm veræ , tùm falsæ Diabetis signa reperiantur , vel an independenter à se mutuo subsistere , & unum eundemque tenorem seu characterem ab initiis ad extrema servare valeant , penes expertos esto judicium , ratio tamen evincit utrumque juxtà vehementiam & varietatem causarum Diabetem producentium posse contingere. Quòd si ita se habeat dissidentium de naturâ , quantitate , & qualitate fluxûs Diabetici Medicorum sententias facilè conciliari nemo non videt , simul & intelligit , ad differentias suprâ memoratas diligenter attendendum , ut affectûs curatio juxtâ diversitatem indicationum possit ordinari.

COROLLARIUM SECUNDUM
De causis tum proximis, tum remotis, fluxûs
Diabetici.

Sic igitur expositis iis quæ ad naturam & differentias affectûs Diabetici pertinent. Jam ordo postulat fluxûs adeò stupendæ causas diligenter inquireri, cum ex harum accuratâ cognitione, remediorum ad illius curationem idoneorum notitia pendeat. Juvat autem in hac indagine, præ cæteris feligere methodum analiticam quâ nempe nulla præstantior ad investigandas detegendasque morborum, & Phænomenum in his apparentium, causas, modo eâ quâ decet, cum curâ & perspicaciâ adhibeatur. Quemadmodum ab Illustrissimo D. D. CHIRAC inclyto hujus Universitatis Professore, & Serenissimi Ducis Aurelianensis Archiatro, jam in omnibus propèmodum ad scientiam Apollinarem pertinentibus fuit adhibita, cujus nimirum hac in parte Laboribus cedro, seu immortalitate dignis, lycæum hoc toto famigeratissimum orbe, suum quo nunc præfulget in primis debet splendorem, & cujus idcirco vestigiis inhærere plurimum gloriamur, semperque gloriabimur. Quamquam in inquirendis analyticè fluxûs Dia-

betici causis, ab illius sententiâ cogamur recedere. Statuit etenim prælaudatus Archiater in limine Theseos de Diabete publicè propugnatae, veluti præcipuum analyseos ad hujus affectûs originem detegendam instituendæ fundamentum, tantam à Diabeticis urinæ copiam effundi non posse, nisi fluidum illud excrementitium in vasis circulatoriis redundet, & cumuletur, quoniam verò liquidum urinosum ex unanimi consensu turget sale quodam falso-acri muriatico, tam volatili quàm fixo. Rectè concluditur, quod quælibet salis ad hanc indolem vergentis generis apta nata sunt promoverè, hæc eâdem veluti causas genuinas illius magnæ congestionis urinarum consideranda.

Verùm si constet ex relatu eorum qui Diabeticum fluxum diligenter observarunt, liquidum illud, quod adeò copiosè, fluit indolem urinæ nullatenus referre, nullamquè prorsus ex illius qualitatibus possidere. Neque demùm, aliud hæc duo fluida quidquam habere quo valeant invicem conferri, præter viam ad trajectum & exitum. Certè planum est analyseos prædictæ basim, & consequentias ex eâ deductas subsistere nequaquam posse. Id autem ut evincatur,

evolvenda sunt , variorum Authorum qui
 de Diabete tractarunt , monumenta , & præ-
 fertim Anglorum , quibus nimirum hujus-
 modi fluxum frequentius observare conti-
 git. VVILLISII nempe , SYDENHAMII ,
 LISTERI , aliorumque summæ notæ Au-
 thorum opera consulenda , in quibus cons-
 tanter asseritur , humorem in Diabete per
 vias urinarias exeuntem ab urinis tum con-
 sistentiâ , tum odore , tum sapore , demum
 & colore summoperè differre. Addamus
 insuper , illud urinas , inter & fluidum
 Diabeticum discrimen , non-modo repetitis
 observationibus , sed & ratione comprobari ,
 si vel leviter attendamus potulenta quæli-
 bet in Diabeticis celerius , & rapidius præ-
 terfluere , quam ut in liquamen urinosum
 verti queant , seu sufficientes in vasorum si-
 nubus moras non trahere , ut salia diversi
 generis , quorum ope sal falso-acre muria-
 ticum efformari supponitur , requisitum
 ineant connubium. Deniquè si liquidum
 urinosum in Diabete tantâ copiâ cumula-
 retur in vasis , indicatio præcipua , quæ
 statim sese offert in hujus affectûs curatio-
 ne , nimirum ut fluxus immoderatus coer-
 ceatur , sine summo vitæ discrimine non
 posset adimpleri. Facile siquidem intelli-

gitur ex hoc urinæ fluxu sufflaminato non salutem , aut levamen ægrorum , imò potius funestum urinarum retro-pulsam in interiora corporis & consequenter certam perniciem expectanda fore. Caveant igitur initiati sacris Hygeæ , ne dum Diabetes , more solito , definitur fluxus immoderatus urinæ , vocabulum illud urina , juxtà nativam significationem accipiant , aliamque perindè quam ratio desideret , aut jubeat observatio , sibi fingant naturæ Diabetis ideam. Hæc etenim vox ideò tantum adhibetur , ut indicetur humoris exeuntis via , vitatoque longiori verborum apparatu , brevior seu vulgata fervetur loquendi formula , quamquam satius fortassis foret erroris vitandi causâ , vocem illam ex Diabetis definitione cum clarissimo SYDENHAMIO penitus expungere , & unicè de succis crudis & incoctis , vel subdulcis , & mellei saporis mentionem facere.

Sed ut ad propositum revertamur , seu ad indagandam analyticè seriem causarum Diabetem producentium , ex præfatis facile datur inferendum , quærendum statim nobis incumbere , non quâ ratione , liquor urinosus generetur & cumuletur in vasis , sed quo pacto fluida cruda , incocta,

insipida, vel succi mellei, chylosi, lymphatici, tantâ cum copiâ per vias urinarias eliminantur.

Quoniam verò illud quod primum apparet in Diabete est fluxus immoderatus, qui quidem prodire nequit, nisi urinaria vasa ad liquidum copiosius transmittendum sint disposita, de hac transmittentium vaporum dispositione, de quâ aliundè rara, vel parva apud Authores mentio, sequentia præmittere juvat.

Ergò statim patet evidentissimè, quod ut humor crudus, seu incoctus adeò copiosè per vias urinarias trajiciatur, quod inquam, hæ viæ, quæ nimirum à glandulis, aut ductibus secretoriis renum tendunt ad vesicam, ad hujusmodi trajectum disponi debeant, seu dilatari, & ampliari; sed solitò magis dilatari nequeunt, quin liquidum quoddam assiduò parietibus earum admoveatur, iisdemque vim inferat consuetâ majorem; nec liquidum continenter parietibus admoveri, nisi fibrarum hosce constituentium textus distrahatur, laxeturque; nec deniquè fibrarum textus distrahi & laxari, quin faciliùs adhuc à fluente liquido distendatur. Ergò geminâ de causâ, nempe propter dilatationem & laxitatem inductas,

inductas, canales à glandulis renum ad vesicam protensi traducendis fluidis reddentur aptissimi.

Ductuum autem distentorum & laxatorum nomine, non modo qui protenduntur à glandulis secretorii communiter dicti, nec tantum papillæ renum, pelvis, & ureteres intelliguntur, sed & ipsasmet glandulas, quibus hujusmodi ductus continuâ serie sunt annexi, dilatari pariter, & laxari statuimus: siquidem analitica ratio superius adhibita, utrumque manifestè demonstrat, & adeò manifestè, ut mirum prorsus videatur, vel levem hâc de re controversiam quotidie moveri, seu quæri & expendi, nùm in profluvio Diabetico, glandulæ renales, & ductus annexi dilatentur laxenturque.

Quo circà tamen discrimen quoddam venit admittendum, inter Diabetem nondum formatam & incipientem, provectam inter & penitus confirmatam. Demùm, & in summo gradu positam: cùm pateat vel leviter attendentibus, dilatationis & laxitatis vasorum gradus, diversos in variis hisce temporibus esse debere. Nempè multò minores in antecessu, & initio morbi: majores autem in progressu; maximos demùm in confirmato provectoque diluvio.

propter moles liquidorum gradatim crescentes, assiduòque trajectas.

Nec interim diffitemur posse controversi, nùm antequam Diabetes invadat dilatatio, laxitasque glandularum, & ductuum renalium, præcesserint, aut præcedere debuerint. Verùm ut hæc dirimatur controversia. 1°. Temperiem nativam, aut adventitiam Diabeticorum. Deindè causas evidentes, quibus hic affectus suam debet originem. 3°. Demùm omnia quæ præcurrere signa diligenter attendi decet.

Si namque Diabeticus, antequam morbus suboriat, majorem urinarum copiam, quàm ea sit aut esse debeat, quæ in statu naturali quotidie profunditur, emittere solitus fuerit, quod ante genesis morbi ferè semper accidit, seu propter immoderatum potulentorum quorumlibet usum, seu ob assumpta diuretica: qualia sunt vina acidula, aquæ minerales, aliaque inferiùs in classe causarum evidentium memoranda; ex hac, inquam, consuetudine meiendi frequentius; & abundantius à quâcumque causâ pendeat, facile datur intelligendum, ductus renales laxitatem præternaturalem & summam ad dilatationem proclivitatem ante Diabetis ortum contrahere debuisse.

Sin autem ex adverso, priusquam diluvium accadat, temperies Diabeticorum ea sit quæ ad traducendam ingentem hanc aquarum molem minimè sit disposita, quod ex mictione secundum naturæ leges se habente, potest inferri, vel si constet causas evidentes fluxum hunc stupendum, absquè ullo prævio dilatationis & laxitatis signo, subito peperisse: quod sanè rarissimum arbitramur, nempè tantam hujusmodi causas energiam habere, ut urinaria vasa confestim, & ex improvîso valeant tantoperè dilatare: illud tamen, si sic evenerit, ut ex assumptis validioribus diureticis, vel ex morfu *Dipsadis*, evenisse quædam testatur observatio. Certè fatendum est ingenuè, nec dilatationem, nec laxitatem vasorum urinosorum *Diabetis* ortum antecessisse. Sed hæc vitia solidorum, ex aquarum subitaneo diluvio derepentè nata, juxtà majus vel minus illius incrementum, pariter crevisse: ità tamen, ut in hujusmodi casibus, ineunte, crescenteque fluxu, sola dilatatio vasorum propter vehementes aquarum impetus arguenda sit, laxitas autem, tantùm in decursu; si nempè fluxus diù perseveraverit ob assiduum laxantis humoris appulsum, inducatur.

Sed ne quisquam nimiooperè miretur, quod de dilatatione, & laxitate vasorum urinosorum, plura quam materies primâ fronte desiderare videtur, aut vulgaris Authorum consuetudo patitur, hûc usque dixerimus. Attendamus tantisper ab hujusmodi solidorum vitiis, non modo feri tenuioris, & incocti, sed & crassioris, imò quoque chylosi, & lymphatici, quale quidem in provecta confirmataque Diabete rejicitur, introitum, sicut & trajectum immoderatos quoad maximam partem esse deducendos.

Nam à dilatatione & laxitate, minor ex parte vasorum intromittentium, & traducentium resistentia nascitur: undè fit ut facile cedant liquidis advenientibus, quibus perindè liberior ad ingressum via sternitur. Mox ex libertate viarum, ab appulsu copiosiori liquidorum, in dies aucta, crescentibusque pari passu laxitate & dilatatione, quid mirum? Si tandem omne crassioris liquidi genus admitti, & eliminari, tumque fluxus Diabeticus ad immediate promoveri gradum: & idcirco rarò prorsus evenire constet, cum hæc summa dilatatō laxitasque quales ad chylum & lympham transmittenda requi-

runtur , nullis emendari remediis , & non nisi rarissimè valeant induci.

Nec iterùm mirabitur quisquam , adeò crebram de dilatatione & laxitate vasorum mentionem fieri , si mente recogitemus attentâ , ex hisce solidorum læsionibus , ipsamet universæ massæ vitia , quibus nempe supponitur vulgò Diabetem induci posse , quoad maximam partem sobolescere.

Nam à laxitate vasorum & glandularum , ut ex præfatis fit evidens , major subsequitur serosi laticis secretio : hinc illius defectus in sanguine , cujus idcirco particulæ tum salinæ tum sulphuræ serò diluente , & solvente destitutæ , intimius uniri , seu crassefieri debent. Ergò multò majores evadent salium & sulphurum moleculæ : exin acredo & visciditas quæ propter continuum , & præproperum serosi laticis effluxum in dies intenduntur ; ab acredine verò dissolutio , à visciditate coagulatione. Rursùm à dissolutione seri lapsus , à coagulatione ejusdem expressio : proindeque serum expeditum toti massæ supernatare , & quâ datâ portâ , nempe per ductus renum dilatatos , & laxatos elabi debere. Sicque consequenter , quod erat demonstrandum , ipsamet vitia sanguinis ad pro-

ducendum fluxum Diabeticum requisita , à vitiis solidorum oriri posse , non ineptâ prorsùs analysi comprobatur.

Cæteras consequentias , quoad symptomatum apparentium in fluxu Diabetico , & indicationum curativarum fontes , quæ similiter , nec operosius ex iisdem vasorum dilatatione & laxitate deduci possunt , lectori perspicaci , & attento eliciendas relinquimus , ne latius extra propositum divagemur.

Sed iis omnibus nixi rationum momentis , liceat fidenter asserere , vitia solidorum non tantùm in Diabete , sed & in omni propè-modum morborum genere non minorem pravis fluidorum qualitatibus attentionem mœreri : interim quoque majorem , cùm læsa solida difficiliùs vitiatis fluidis restituantur. Nec mirum , cùm ea quæ naturaliter situm & formam majori cum firmitate solidorum instar retinent , eâdem semel amissâ , nisi difficulter resumere valeant. Dum ex adverso fluida varias in formas , vel levi negotio mutabilia multò faciliùs ad nativam recuperandam sunt disposita.

Sed de his satis , ex quibus haud difficulter potest intelligi , cur ab assuetâ me-

thodo recedentes , analyticam causarum indaginem , à solidorum priùsq̃uam à fluidorum vitiis orsi fuerimus. Nec minùs pateat ex præfatis in Diabete fluxum immoderatum humoris incocti , nec supervenire , nec perseverare diù posse ; quin urinaria vasa solito magis amplientur.

Jam verò quoniam cavitates glandularum , & continuorum ductuum ab incocctis humoribus distendi nequeunt , & laxari , nisi iidem humores ostiola secretoria glandularum ingrediantur , qui quidem ingressus præviâ secretionem necessariò supponit ; hinc quo ritu secernantur hujusmodi fluida , paucis exponi , series ordinis servandi desiderat.

Ergò vel à nimia pororum , seu ostiolorum quibus colum instructum est dilatione & laxitate , vel propter humorem analogum , seu consimilem humori secernendo , & hæc eadem ostiola imbuentem implentemque , vel demùm utriusque ratione , facilis humoribus appellentibus ad interiores glandularum sinus præbetur aditus. Hi duo siquidem unicè tamquam evidentiores , seu probabiliore secretionum modi possunt assignari , dilatationem autem

& laxitatem meatuum secretiorum hîc partes suas implere, vix potest in dubium revocari; si nimirum superius allegata sedulò revolvantur. Cum eâdem analytica ratio quæ superius adhibita fuit, ad demonstrandum cavitates glandularum ab humore jugiter transeunte dilatari laxarique, hæc eâdem, inquam, sicuti jam fuit indicatum, ostiola secretoria pariter à liquidis appellentibus assiduò dilatanda, laxandaque manifestè comprobet. Nec illud propositum indiget ulteriori demonstratione, si nempè concedatur ex æquo succos incoctos ad renes uberius appellere. Constat etenim massam humorum per arterias emulgentes ad renes delatam hujusmodi succis turgere, iisdemque à consortio cæterorum, uti probabitur infra, liberis & expeditis. Ergò de copioso liquidorum ad glandulas appulsu, non minùs constare debet. Et sic evidenter evincitur ostiola secretoria glandularum necessariò dilatanda laxandaque.

Verùm hujusmodi tum dilatatio, tum laxitas, utut desideratæ secretioni non parùm faveant, ad illud tamen officium implendum, & absolvendum, impares esse judicabuntur, si tantisper attendamus per

poros adeò patentes & laxatos , non modò crudos & incoctos humores , sed & quælibet alia recrementa pariter traducenda , perindeque necessariò modus alter secretionis superiùs allegatus , nimirum humor analogus , ad singulares & determinatas secretiones explicandas , mire prorsùs idoneus , in subsidium vocandus est. Et hujusmodi quidem humor admittendus qui juxtà receptam doctrinam , indolem humoris secernendi , idest crudi seu incocti , non autem urinosi penitùs æmuletur. At vel leviter attentis fit obvium ostiola secretoria glandularum peregrinis seu novis humoribus , nec imbui , nec impelli posse , nisi liquidum analogum ipsis naturaliter insitum immutetur , debilitetur , aut ita loco moveatur , ut quominùs advenientia liquida sedem illius occupent , minimè valeat præpedire : perindeque mutationis hujus , debilitatis , aut loco motionis causa , paucis , venit assignanda.

Quo circà verò proximum videtur , à particulis aqueis in universâ massâ luxuriantibus , jugiter ad renes appellentibus , & idcirco laxantibus glandularum ostiola , liquidum analogum iis insitum , utut eorundem parietibus ab ortu tenaciter im-

factum , repetitis tamen liquidorum appulsibus , tandem è sede suâ deturbari , vel ejus vires ab humore novo prædominante , sic infringi , seu indolem sic immutari , ut assueto muneri fungi nequeat.

Accedit insuper , quòd quò majores crudorum humorum copiae congeruntur in vasis , & ad renes deferuntur , eò quoque minores urinosi feri , sicut & aliorum recrementorum genesis & appulsus fieri debeant : undè sequitur quòd minuatur , aut deficiat pabulum destinatum humori renum analogo reficiendo , ex quo defectu virium , illius energia plurimùm infirmatur ; perindeque minùs habilis evadit ad resistendum assiduïs , & copiosis humorum crudorum appulsibus ; ità ut crebris eorundem ictibus , indefinenter lacescit & velut inundatus aquarum alluentium diluvio , demùm , & ob crescentem in dies pabuli consueti penuriam , ad summam reductus debilitatem , è sedibus suis vel invitus excedere , vel effoetus , seu omni penè robore destitutus , inersque cogitur evadere. Dùm interim succi crudi & incocti viribus integris instructi , novisque quolibet instanti copiis instaurati , seu è fonte jugi perennique scaturientes , vacuos , dilatatos,

laxatosque demùm meatus implent : & ideo novis consimilium humorum secretionibus reddunt aptissimos.

Sicque tandem omni conditioni , tum ad trajectum , tum ad secretionem fluidorum præternaturam , satisfactum existimantes , jam illud præsertim impendet negotii , ut undenam prodeat hic humor , qui tam abundanter ad renes appellit , eorumdemque sinus secretorios ingreditur , eâdem investigemus methodo.

Hic autem ut glandularum ostiola subeat , haud dubiè convehendus est per arterias emulgentes , è quarum finibus expansis glandulosa renum conceptacula fieri videntur : nec enim ullæ aliæ præter hæc vasa prostant viæ , quibus humor ad renes appellere queat , sed in arteriis , aliud nihil quam latex purpureus , seu sanguis , continetur : ergò sanguis arteriosus fons est unicus liquidi secernendi.

Verùm utcumque sanguis turgeat hoc humore , eodemque turgidus appellat ad ostiola renum secretoria , non ideo tamen hæc eâdem subiturus est , nisi præfatus humor è reliquorum massæ principiorum consortio liber sit & expeditus. Si namque compedibus sulphurum vinctus , seu

eorundem partibus ramosis involutus detineatur , aut terrestrium particularum sinubus immersus hæreat , vel cum cæteris massæ moleculis , quomodocumque confundantur. Certè planum est sic abditum , intricatum , & immersum , non nisi difficulter , & ægerrimè meatus secretorios ingressurum : undè luce meridianâ clariùs evincitur humorem secernendum liberum , expeditum , & ad ingressum paratissimum esse debere ; perindeque quo pacto serum extricetur è sinu massæ , vel eidem supernatet paucis exponendum.

Ergò nequit humor reticulis sulphureis antea vinctus ex his sese expedire , nisi vinculorum hujusmodi nexus solvatur , nec idem , terrestrium particularum sinubus immersus , ex iisdem emergere , nisi terrena conterantur , & diffringantur ergastula , nec ex utrorumque loculamentis exprimi , nisi hæc eâdem , juxtâ receptam doctrinam , in arctum compellantur seu angustentur : neque rursus possunt liquidâ constanter & celeriter certum sequi tramitem , & motu progressivo , rapidè , sicut in Diabete , ferri , si motionis intestinæ seu effervescentiæ viribus assiduò confundantur. Verbo dicam , juxtâ receptas loquendi formulas , vel se-

rosam laticem è sinu massæ propter dissolutionem elabi, vel ab eodem exprimi propter coagulationem: & idcirco solutis aut coagulatis particulis, ita supernatare, ut liber & impermixtus per poros secretorios patentis laxatosque extrà circulationis orbem amandari queat.

Verùm in hoc præcipuè, difficultatis cardo vertitur, an serum propter dissolutionem effluat, vel ratione coagulationis exprimatur, cujus certè nodi solutionem, non adeò facilem judicabit, quilibet attendet ad vim argumentorum in utramque partem militantium: hinc etenim est quod Authores iique summæ notæ, in varias abierint sententias; ità tamen ut horum plurimi dissolutionem, seu ut eorum vocibus utar, colliquationem, cæteri verò coagulationem arguant.

Prioris namque seu dissolutionis certa manifesta que dare videntur indicia. I. Fluxus immoderatus quantitatem assumptorum longè superans; hæc etenim ingens feri copia, aliundè magnâ cum celeritate secreta, summam humorum fluxilitatem, fluxilitas autem eorundem insignem agitationem; agitatio demùm pedissequam dissolutionem indicant.

II. Sapor melleus , & color albicans , qui si fidendum sit Authorum observationibus , non infrequenter in seroso latice Diabeticorum percipiuntur , & adscribuntur communiter chylo vel lymphæ , cum hoc eodem sero mixtis & confusis , ejusdem haud dubiè dissolutionis prædictæ sunt effecta ; siquidem chylus & lymphæ in statu naturali sero crassiora sunt , nec consequenter per oscula renalium ductuum , utut solito magis patentia secerni queunt , nisi particularum ex quibus constant , majores & crassiores moleculæ summoperè dividantur & tenuentur. Nec hæ dividi , tenuarique sine dissolutione.

III. Vehementer sitiunt , æstuant , ardent , & intra brevè temporis spatium exsiccantur Diabetici : quæ quidem symptomata massam sanguinis universam calefieri & effervesce ; subindè liquari lympham , pinguedinem fundi , succos alibiles & humidum omne resolvi , verbo magnam promptamque colliquationem , seu dissolutionem fieri , satis apertè declarant.

IV. Nec minùs manifestè dissolutionis labem in Diabete liquidis inustam esse colligitur , ex causarum evidentium consideratione : cùm ex Authorum fide dignissi-

morum observationibus , hic fluxus febribus ardentibus , aliisque morbis acutis qui calorem intensum habent adjunctum , interim superveniat. Cum ut plurimum oriatur ab esu salitorum , acrium , piperatorum , ut & immoderato spiritus vini & liquorum ardentium potu ; cum non raro vinis arsenici mixtura , vel fumo sulphuris alteratis , & medicatis diversimodè , natales suos debeat ; cum insuper inducatur à Balsamicis Therebentinatis , & Opiatis. Cum denique post assumptas aquas muriaticas , salinas , sulphureas , metallicis , & igneis particulis turgidas emergat : hæc etenim & similia sanguinem ex omnium consensu fundunt , liquant , seu dissolvunt.

V. Demum & ultimò , liquatum pariter in Diabete seu dissolutum sanguinis textum , evidentissimè patefaciunt. Quorundam Diabeticorum curationes , propter lenientium , edulcorantium , incrassantium , compingentium , seu lacticiniorum , mucilaginosorum & adstringentium usum ex voto succedentes : horum etenim ope permulti vel integrè curati , vel non exiguum , affectu sæviante levamen senserunt Diabetici.

Et hæc quidem argumenta , quibus præ-

sens humorum in Diabete dissolutio designatur , nudè licet , & simpliciter exposita , sic in omnium oculos incurrere possunt , ut nostro quidem iudicio , parum egeant longiori tædiosoque , seu quod idem est , analytico verborum circuitu , quo vis eorundem in evidentiorum lucem proferatur.

Jam igitur in medium adducamus ea quæ demonstrant Diabetem à sanguinis coagulatione pendere , quæ quoniam nec minùs perspicua , nec intellectui rudiorum minùs jam allegatis sunt accommodata , eàdem quoque cum brevitate & simplicitate debent exponi.

1^o. Coagulatum in fluxu Diabetico seu crassèfactum viscidumque sanguinem esse , satis evidenter conjicitur , ex eo quod , is qui tam copiosè & celeriter excernitur humor crudus , incoctus , insipidus , demùm & pellucidus frequenter appareat : cruditas enim , insipiditas & pelluciditas defectum fermentationis , divisionis , attritus , macerationis , & miscelæ particularum fluidi necessariò supponunt. Cùm ex adverso si viribus intensæ fermentationis massa solvatur , & consequenter fiat omnium liquidorum confusio , planum sit illud quod ab eàdem massa fluit , exitque per
vias

vias urinarias turbidum, lutulentum, fæ-
linum, acre-sulphureum, terrenum, ver-
bo, particulis omnigenis onustum esse de-
bere.

2^{um}. Ad coagulationem in Diabete de-
monstrandam argumentum petitur, ex cau-
sarum procatharticarum notitiâ, cum hic
fluxus frequentius accadat in frigidis re-
gionibus ad Septentrionem vergentibus,
in quibus aër & alimenta crassiora sunt,
& aliundè frequenter invadat temperiem
melancholicam, in quâ sanguis viscidus,
terrestris, siccus, sale & sulphure crassiori
foetus, seu resinofus statuitur. Accedit,
ab epotis aquis acidulis & vino ejusdem
indolis liberaliùs ebibito, sicut & à ven-
triculi vasorumque tono propter ingluviem
cibi, potûsque summoperè debilitatis, &
consequenter à frigidis, resinosis, acidis,
crudis, verbo, coagulatis humoribus flu-
xum hunc aliquoties ortum sumpsisse.

3^o. Febris absentia, vel febricula in
Diabete superveniens, sanguinem non nisi
tardè, lentè, difficulter agitari, moveri:
subindèque crassas potius & viscidas illius
moleculas, quam divisas tenues & solutas
inducant.

4^o. Denique constat ex variis observa-

tionibus, cardiaca, reficientia, martialia, & fale volatili oleoso turgida, plurimis Diabeticis non parùm profuisse: quæ quidem summam potiùs inferrent noxam, si fale falso-acri fundente, liquante, solven-teque, massa constanter luxuriaret.

His igitur & similibus rationum & experimentorum momentis, sanguinem in Diabete coagulari potiùs quam dissolvi statuitur, illudque coagulationis gènus confertur, modò cum lacte per affusionem acidorum inspissato, sic ut subsidente & arctiùs unita crassiori parte, serum exprimatur, & supernatet, modo verò cum glutine ad medias cocto, & cum aqueis immiscibili, aliàs demùm cum resina consortium aquæ respuente turgidaque tamen particulis salino-sulphureis, quæ cum insensili motu jugiter agitentur, & humido deficiente, tandem accendantur, sitim ingentem, calorem igneum, viscerum ardorem, marcorem horrendum, aliaque id genus symptomata, absque ullo dissolutionis subsidio valent producere.

Jam ergò patet ex præfatis, argumenta non minoris ponderis ad coagulationem, quàm ad dissolutionem in medium proferri, & utramque sententiam fulciri gravissimis

rationum , & experimentorum momentis, quibus ritè penitùsque perspectis , nihil haud dubiè sanæ mentis legibus consentaneum magis videbitur , quàm ut statuatur serosum laticem è sinu massæ propter utrumque , tùm dissolutionis , tùm coagulationis vitium , effluere posse. Sic ut juxtà varietatem temperierum , & causarum evidentium , nunc à liquefacto , nunc ab inspissato sanguine , & interdum ab utraque pravâ qualitate conjunctim agente : sæpiùs tamen à colliquatione fluxûs Diabeticus oriatur ; aliundè probè persuasi , clarissimos artis Proceres , in varias , hâc de re , partes ideò secessisse , quòd Diabetis , & in variis subjectis , & in eodem individuo differentias non satis attentè perpenderint ; sed ex peculiaribus quibusdam observationibus , aliorum experimentorum spretis aut neglectis , systema suum stabiliri , fingique posse , crediderint. Si namque contulissent ex æquo varias Diabeticorum historias , in monumentis Authorum fideliter exaratas : simul & seriò considerassent summum illud discrimen , quod in diversis Diabeticis ratione quantitatis , & qualitatis humorum excretorum à viris perspicacibus fuit observatum , magnamque diversitatem , quoad tempera-

menta, causas evidentes, eventus, & symptomata, denique varios hujus affectûs in invadendo, crescendo, sæviendo, desinendoque modos diligenter expendissent: ex his, inquam, omnibus accuratè exploratis, haud dubiè pervidissent fluxum Diabeticum, non unam & eandem in diversis subjectis indolem exhibere; imò variam interdum in uno eodemque Diabetico, & in diversis morbi temporibus faciem præferre; subindèque multiplicem causam immediatam admittendam censuissent.

Hinc igitur est, quod nunc dissolutionem, modò verò coagulationem: priorem tamen frequentius, & interim utramque simul, in Diabete suas ad tantam feri copiam suggerendam conferre vires arbitremur; ità ut ex hisce pravis qualitatibus, alterutra fluxûs ortum antecedere, vel jam excitatum fovere possit & intendere; interim ambo se mutuò excipere; modò denique junctis unà viribus agere valeant. Quamquam verò proximum est, quod ubi fluxus sit immoderatio, & symptomata supervenientia prætermodum augmentur, coagulationem humorum, eorundem coagulationi plurimum prævalere. Dùm ex adversò si recens adhuc sit morbus, si quan-

titas exeuntis humoris non multum superet copiam assumpti, si liquidum crudum, pellucidum, & insipidum excernatur, si denique sitis, calor & ardor non admodum urgeant, & spissitudinis causæ præcesserint, coagulationem potius arguendam censemus.

Horum autem veritas & demonstratio, non tantum ex argumentis superius allatis, seu ex varietate fluxûs, causarum ejus evidentium, symptomatum & eventuum eruenda venit, sed & ex consideratione particularum diversi generis, quibus in hoc statu morbofo sanguis propter ingluviem cibi, potûsque, diversæ pariter indolis potest turgere. Paucissimi siquidem, ne dicam, nulli mortalium, in Diabetem, sicut in alios morbos incidentium, adeo simplici genere victûs usi sunt, ut adveniente ægritudine corpuscula diversæ naturæ, seu acidum, alkali, simul & glutinosum accusare nobis non liceat. Ità ut certum sit massam humorum in Diabeticis, principiis, ut ita dicam, omnigenis luxuriare, quorum alia ratione summæ mobilitatis, & naturæ præfervidæ, tenuare, solvere, & liquare valent, dum cætera fixiora, viscidiora, & idcirco minus mobilia, divisioni suæ resistunt, imò si tenuiora & flu-

xiliora dissipentur , majorem adhuc crassitiem debent adipisci. Sicque tandem ex præfatis , duplicis serosi laticis scaturiginis , nimirum coagulationis & dissolutionis ratio patescit.

Ex quibus pariter datur intelligendum , cur Diabetes communiter Hydrops ad maculam appelletur , ductâ procul dubiò, utriusque affectûs comparatione à communibus aquarum exundantium scaturiginibus , quas similiter in Hydropicis , tum coagulationem , tum dissolutionem sanguinis esse unanimiter statuitur , quasi nullum aliud discrimen inter utrumque morbum intersit , quàm quod aquæ luxuriantes in Hydrope colligantur intus , in Diabete verò exiùs effundantur , sed ex iisdem fontibus utrobique prodeunt ; & in eo mirè prorsus Hydrops & Diabetes videntur convenire , licet fatendum sit ingenuè , quod in hoc posteriori morbo fontes aquarum multò sint uberiores , undè fit ut velociùs , & vehementiùs Diabetes ut plurimum tempora sua percurrat , & in majus multò discrimen conjiciat ægotantem , simul & ex eo potest intelligi , cur Diabetes Hydrope rariùs generari , tum & rarissimè valeat perfanari.

Jam verò quod attinet diversum modum quo sanguis in Diabete liquari vel coagulari valet, hic certè vix potest determinari, cum insensibiles salium & sulphurum à quibus inducuntur hujuscemodi vitia particulæ sub sensus minimè cadant, nec alia quædam in tantâ caligine lux affulgeat, quàm quæ petitur ex vulgatis & familiaribus exemplis mixtorum, quorum alia ab affusis acidis instar lactis, vel propter visciditatem, aut siccitatem in modum glutinis, aut resinæ inspissantur; alia verò fervoris, percussionis, aut luxuriantis liquidi viribus dissolvuntur.

Quas equidem coagulationum & dissolutionum species juxtâ diversitatem principiorum massæ, & causarum in eandem agentium, modò seorsim, nunc verò conjunctim in Diabete generari posse censemus: etsi dùm attentius consideratur indoles symptomatum veram & confirmatam Diabetem communiter stipantium, nimirum sitis, caloris & siccitatis vehementia; dicendum potiùs & statuendum videatur coagulationem Diabeticam ad naturam æstuantis resinæ, vel glutinis ad medias cocti, quàm lactis ex affusis acidis inspissati propriùs vergere. Dissolutionem autem ex

adversò sæpiùs ab humidis exundantibus & laxantibus , quàm à percutientibus induci : sic ut fluxus immoderatus multò magis à laxato nexu particularum , quàm ab eodem cum impetu soluto , pendeat. Idque potissimum infertur , tùm ex immoderato liquidorum potu , Diabetis ortum , ut plurimum præcedente & comitante , tùm ex absentia febris , aut levi tantùm febriculâ , quæ remissum fermentationis genus supponit. Demùm & ex humoribus excretis , crudis , incoctis , pellucidis , fervoris defectum & laxitatem indicantibus.

Ubi tamen non levem statim controversiam moveri posse cernimus , utpotè quod humidum laxans solvensque particularum nexus , sensim tantùm agere queat , nec consequenter omni conditioni requisitæ satisfacit , cum fluxus Diabeticus non infrequenter accidat subito , sicque causam confestim solventem desideret , quæ quidem in allato laxantium casu vix potest assignari : nisi supponatur quoddam velut aquarum diluvium , quo tota massa siciderepente perfundatur , ut causas cohæsionis particularum inter se nullâ prorsùs interpositâ morâ , vincat aut debilitet , sed Diabetes interim excitatur , quin adsint ulla præcedentis dilu-

vii signa : Ergò memoratus dissolutionis per laxantia modus in fluxu Diabetico nequit admitti.

At si tantisper attendamus sanguinem Diabeticorum , sic ferè semper esse prædispositum , ut crudis seu incoctis particulis luxuriet , quæ nimirum hæterogeneitatis & molis ratione parùm firmiter inter se cohærent , & quæ propter debilitatum vasorum elaterem , simul & infirmatam fermentorum energiam , ad intimos contactus , mutuosque subingressus adigi nequeunt , in hoc inquam , statu massæ sanguineæ , dùm adeò laxa sunt vincula , particulas ejus nectentia , certè nec magni , nec vehementes desiderantur causarum supervenientium impetus : sed vires admodum leves , nifusque prorsus exigui requiruntur , ut subitaneus accidat particularum liquidi secessus , sicque serosæ , lymphaticæ , chylosæque partes à solito connubio liberentur.

Verùm hæc dubiò procul sufficient de causis proximis , & remotis , licet alia non pauca , jam præfatis adhucdum subjungi posse videantur. Sed cùm de vitiis fluidorum respectu curationis , nihil aliud scitu necessarium habendum sit , præter ea quæ superius accuratè satis discussimus & statui-

mus , his ulteriùs prosequendis juvat super-
sedere , nec ad ea dilucidius demonstranda
methodum analyticam in prægressis adhi-
bitam , ulteriùs in subsidium advocare ne-
cessarium duximus : si namque præfata ra-
tionum , & observationum momenta eo quo
par est modò ponderentur , opinionis nos-
træ de vitiis fluidorum in Diabete funda-
menta , absque verboso analyseos apparatu
facilè possunt introspecti.

Nec iterùm plura de causis evidentibus
addere consilium est : cum ex iisdem pari-
ter quæ superiùs adversùs ordinis consueti
leges interserenda fuerunt , ut quid sentia-
mus de causis immediatis faciliùs innotef-
ceret ; ex his , inquam , hujusmodi causa-
rum remotarum , & evidentium numerus ,
indoles , & agendi modus , vel leviter at-
tentis patefiant.

COROLLARIUM TERTIUM
De præcipuis symptomatis Fluxûs Diabetici.

ERgò dicendorum series jam expostulat
ut exponatur præcipuorum morbi symp-
tomatum ratio , quæ quidem non admodùm
operosè ex prælibatis deduci possunt : nec
etenim magna mentis perspicacia deside-

ratur , ut intelligamus quâ fiat , ut ex totâ
hactenûs assignatis caufarum remotarum &
proximarum speciebus , quarum plures, non
infrequenter junctis agunt viribus, nimi-
rûm ex coagulato glutinis inftar , aut re-
finæ , vel foluto fervidoque fanguine; sub-
indèque ferofis , lymphaticis , & chylofis
humoribus per patentes laxatasque vias uri-
narias exeuntibus , & confequenter in finu
maffæ deficientibus , quâ fiat , inquam , his
fuppositis , ut fitis intensa , calor ingens ,
urens febricula , debilitas metuenda , de-
mûm & horrendus marcor , aliaque id ge-
nus fequuntur.

Verûm tamen summam inter cætera
mœretur attentionem , insignis hæc & acer-
biffima fitis , quæ frequenter fluxum Dia-
beticum antecedit , cum eo faltem perpe-
tuò fuboritur , pari cum ipfo paffu , cref-
cens & incedens , demûm & ab ortu ad
ultimum ufque morbi finem indefinenter
fæviens.

Dicimus ftatim Diabeticos antequam in
morbum incidant , ferè femper effe fiticu-
lofos , quod fanè non exiguâ dignum ani-
madverfione : quoniam illud fymptoma , eo
fub afpectu confideratum , non tam affectus
morbi quàm ejufdem caufa cenferi debet ;

dùm videlicet sitis ad promiscuos omnis generis potus quotidie sorbendos volentes, vel nolentes adigens, solidorum & liquidorum insignibus vitiis, superiùs expositis ansam præbet.

Hæc autem sitis antecedens, haud dubiè nascitur ex pravâ consuetudine ingerendi promiscuè edulia omnis generis acrida, salita, acida, glaciata, tum & potulenta diversæ naturæ, non modò, dùm cibus ad vitam sustinendam, ex instituto, sumendus est: sed & in variis tum diurnis, tum nocturnis computationibus; quibus nempè magna pars mortalium, seu voluptatis causa, seu ad impinguandum corporis habitum, coloremque faciei vividiorum gerendum, seu demùm ad sedandas inertis, incompositæ mœstæque mentis perturbationes, heu nimium indulget.

Sed utcumque non diffiteamur ab eduliis, potulentisque sapidioribus palatum statim titillari, mox animam quodam lætitiæ sensu perfundi, imò cutem interdum pinguiorem, & floridiorem evadere. Certè nec minùs ingenuè fateri cogimur, quod ex hâc ingluvie, pravaque bibendi sine modo consuetudine, præprimis suboriantur fervores humorum immoderati, quos

necessario diversi generis dissolutiones, & coagulationes juxta varietatem temperierum, & ingestorum subsequuntur: ex fervoribus autem & coagulationibus acredo, visciditas & aciditas liquidorum sobolescunt; ex his saliva particeps earundem qualitatum & consequenter æstus, siccitates oris, & irritamenta faucium, verbo molesta sensatio quæ sitis nuncupatur, & quâ vel inviti ad intempestivos, nocivosque potus iterandos adigimur; ex quibus iterum eisdem effectus, sed intensiores multò manare sic necessum; sicque sitis, ingluvies & compositio se mutuò foveant & intendunt, demùm & ad eum usque gradum promoventur, ut vel ex levi rerum non-naturalium abusu, vel ex præternaturalium accessu, partes solidæ, fluidæque, tot hætenus insultibus concussæ lædantur insigniter; undè non modò Diabetem, sed & infinita penè morborum genera, pro vario læsionis modò scaturire datur intelligendum.

Nam iterum ex hac antecedente siti, subindèque potibus assiduis & immoderatis, fit ut exundantibus undequaque liquidis contentorum in vasis fluidorum compages solvatur, debilitentur solidorum elateria,

fermentorum omnium infirmetur energia, tum & recrementorum quorumlibet generatio præpediatur : sed si solvantur, diluantur, & immergantur fluidorum & fermentorum moleculæ, laxeturque vasorum digerentium tonus ; certè quælibet assumuntur edulia cruda prorsus & incocta remanebunt ; succorum autem crudorum & summo perè dilutorum illuvie ductus, & glandulæ renum debent dilatari, laxari, locoque pelli humores analogi. Ergò succedent eorundem humorum incoctorum secretiones & excretiones immoderatæ, seu fluxus Diabeticus superveniet : cujus idcirco sitis antecedens tamquam præcipua causa debet agnosci ; hunc verò fluxum deindè nova sitis priori multò vehementior subsequitur, quæ tum non amplius causæ sed symptomatis considerationem promærebitur.

Hujus autem novæ sitis ortus & violentia, dubiò procul hisce pariter novis & immoderatis humoris excretionibus est adscribenda : quarum ratione fit, ut salivæ non minùs ac cæterorum recrementorum materies in vasis deficiat, simul & ea quæ remanent liquida visciditatem contrahant ; hinc igitur, novæ palati, faucium siccita-

tes, & irritationes, consequenter sitis intensior, moxque potus immoderatio; unde rursus eâdem quæ superius recensita vitiorum genera, sed vehementiora. Sicque tandem cur in Diabete sitis modò causæ, nunc verò symptomatis rationem habeat, satis apertè demonstratur.

Nec magis operosè, vel perspicuè minus ex iisdem principiis cæterorum symptomatum explicatio potest elici. Si namque semper sitiant bibantque Diabetici, si vasorum, & fibrarum motricium elateria idcirco debilitentur, fermentorum naturalium minuatur energia, succi cumulentur incocti, crassescat, aut liquetur massa, si denique serum foras amandetur. Ex his, inquam, haud dubiè non una sed multiplex caloris, ardoris, anxietatis, debilitatis, febriculæ, funestique marcoris causa deducetur, cum vel unicus serosi laticis fluxus immoderatus, his omnibus pravis effectis pariendis sufficiat: liquidis enim sic exeuntibus, perindeque deficientibus in orbita vasorum, evidens est universam massam difficiliùs multò per eâdem vasa debere circumduci, hinc ejusdem in Capillaribus mora, ex quâ calor, ardor, anxietas, & febricula faciliè sobolescunt. Cæteras con-

sequentias quæ possunt vel à rudioribus, seu leviter in Physiologiâ versatis, ex iisdem suppositis inferri, consultò prætermittimus, ne videlicet hæc nostra Dissertatio producat in immensum. Cùm aliundè nemini mirum videri debeat Diabéticos, in hoc misero prorsus rerum statu debilitari, marcescere, consumi, dùm ob liquidorum & solidorum vitia toties memorata, simul & stupendum humoris effluxum, nec succi nutritii, nec spiritus generari, nec utcumque geniti deficiente vehiculo distribui queant, aut si qui succi generentur & distribuantur, hi propter æstum & acridinem ad consumenda potius liquandaque quæ supersunt, quam ad eandem nutrienda roborandaque apti debeant esse.

COROLLARIUM QUARTUM
De prognosi Fluxûs Diabetici.

ERgò ulteriori symptomatum explanationi supersedentes, jam ad prognosim instituendam accedamus. Et statim ab eo quod primùm apparet, seu Diabetis essentiam constituit sumentes exordium, nimirum ab immoderato, celerique serosilaticis effluxu, patet ex eodem summum
Diabeticis

Diabeticis imminere vitæ periculum , cum tantâ nequeat è vasis urinariis exire liquorum copia , quin eorundem consueto penu quælibet tùm solidæ , tùm fluidæ corporis partes defraudentur , nec iisdem solidæ fluidæque partes defraudari , quin omnes motus tùm naturales , tùm voluntarii à perenni fluidorum circuitu , æquali distributione , debitâque miscelâ pendent , summoperè lædantur aut pervertantur. Ergò vel ob unicum immoderatum liquorum exitum magnum Diabeticis impendet discrimen , illudque procul-dubiò tantò majus , quantò major erit humorum exeuntium abundantia.

Rursus ex eodem immoderato fluxu summum , juxtà superius statuta , tùm solidorum , tùm fluidorum vitium arguitur , nempe laxitatis , dilatationis , debilitatique ductuum trajicientium elaterii , ut & coagulationis , vel dissolutionis massæ sanguineæ , vel utriusque ; ità ut pro variâ fluxûs magnitudine & frequentia , depravationum harumce gradus , & consequenter periculi magnitudo præfagiri possint. Ubi notandum obiter quod si præfata vitia in variis Hydropum speciebus rarò prorsus emendantur , & ideo tantoperè sint metuenda,

quantò rariùs in Diabete valeant emendari in quâ multò major moles aquarum è sinu vasorum erumpit , quantòque magis hic morbus timendus sit nemo non videt.

III. Quo magnum in quo Diabetici versantur discrimen , evidentiùs innotescat , non modò fluxûs abundantiam , sed humoris exeuntis indolem attendi decet. Si namque quod excernitur subdulcem , melleum , lacteumque saporem , simul & albicantem colorem referat , sicque pateat non modò crudos & incoctos humores , sed chylum , lympham & pinguedinem quibus corpus reficitur , alitur , roboratur è vasorum sinibus amandari , certè summam virium debilitatem , marcorem horrendum , lethalem denique tabem inducenda , liquidò demonstratur.

IV. Tùm ex causis antecedentibus , tum ex temperie Diabeticorum , varia quoque præfagia ducenda sunt : si nempe causæ Procatharticæ magnarum sint virium , aut indolis deleteriæ ; si fluxûs immoderatus ægrotantes jam præcedenti quodam acutoque morbo propè-modùm exhaustos adoriatur ; si magnos & diuturnos errores in regimine vitæ commiserit ; si Diabeticus à parentibus infirmis ortum duxerit , idem-

que debili prorsus constitutione sic præditus ; si variis affectibus renum & vesicæ jam fuerit obnoxius ; & si tandem in antecessu morbi propter motus corporis, aut mentis immoderatos ; fractus elumbis ad summam denique debilitatem redactus videatur. Certè nullam, aut exiguam prorsus salutis spem superesse facile quivis pervidebit.

V. Demùm & ultimò , quo summi discriminis imminetis ex Diabetico fluxu ratio certiùs adhuc & meliùs intelligatur, diligenter debet animadverti , quod hic affectus instar Hydropis non ab uno tantùm eodemque malla sanguineæ vitio, scilicet à coagulatione vel dissolutione , sed ab utrisque conjunctim sese mutuò foventibus , aut excipientibus ut plurimùm pendeat : undè nascitur indicationum curativarum contrarietas ; sic ut ex his uni vix possit satisfieri , quin alteri noceatur , perindeque vel ipsorummet artis præsidiorum, utut prudenter adhibitorum effectus , aut inutiles futuri sunt aut non parum mutuendi.

Quibus insuper addendum est , quod nec variis , tùm dissolutionis , tùm coagulationis modi quorum ratione fit ut serum è sinu sanguinis exprimatur simul & adveniens

humor cum cæteris , massæ particulis misceri nequeat , quod , inquam , harum coagulationum , aut dissolutionum species nec dignoscantur , nec à perspicacioribus dignosci valeant : undè sequitur generica tantùm remedia posse præscribi, quæ singulari læsionis speciei morbum immediatè producenti corrigendæ sæpè sunt imparia , ut perindè causarum & modorum coagulationis & dissolutionis emendationes, à solius propemodùm naturæ viribus sperari debeant, quæ certè vires cum abundantia fluxûs instanti quolibet exhauriantur , aut prægressis erroribus jam ferè penitùs sint exhaustæ , quid mirum ! Artis , & naturæ præsidiiis penè destitutum , Diabeticum tandem exsuccum & consumptum ultimi fati necessitatem subire , aut saltem in maximo versari vitæ discrimine.

Absit interim , ut ex his inferatur Diabete laborantes miseræ suæ sorti velut in casu desperato penitùs relinquendos , quinimò quò circumfidentur urgentiori periculo eò quoque diligentius & attentius ipsis succurri , tùm humanitatis , tùm scientiæ leges desiderant. Cum aliundè constet ex variis Authorum observationibus non-nullos ex hoc aquarum diluvio feliciter eva-

sisse, dum nempe nativa corporis temperies, firmitudinis & vigoris quædam adhucdum indicia præbet, nec partium internarum robur, seu ægritudinis cujusdam præcedentis vehementia, seu pravi regiminis malignitate prorsus consumptum est, nec aliundè fluxus ad majorem ultimumque gradum pervenit: dùm denique variæ quæ sese offerunt indicationes adeò sibi invicem non opponuntur, ut ex his præcipuam implere liceat, quin alteri summo perè noceatur; in his, inquam, & similibus rerum circumstantiis planum est non levem salutis spem affulgere, cunctaque diligenter tentanda quo Diabetici liberentur ab imminente periculo.

COROLLARIUM QUINTUM
De Therapeiâ Fluxûs Diabetici.

QUapropter ad convenientem medendi methodum exarandam jam accedentes, illud præsertim hâc in parte negotii nobis videtur incumbere, ut juxta quæstionem in limine Theseos propositam demonstretur ad sanandam Diabeterem, non unum, sed multiplex remedii genus adhibendum, quod equidem si præfata superius

in animum sedulò revocentur, nec arduum, imò nec difficultatem vel levem faciscere videbitur.

Si nempè tantisper attendamus, uti jam fusè probatum fuit fluxum Diabeticum, non ab unâ sed multiplici causâ pendere, variamque prorsùs in variis subjectis, imò in uno eodemque individuo, sed in diversis morbi temporibus præferre faciem, quatenùs vel ab acidis, vel ab acris, aut à falsis, interim à viscidis & glutinosis, nunc seorsim, sæpiùs verò conjunctim in eâdem massa luxuriantibus & agentibus, inducatur: undè fit, ut sanguis coaguletur, modò verò dissolvatur, & interdum utroque vitii genere depravetur. Deindè verò, si seriò cogitemus, hæc varia causarum genera, juxta varietatem temperierum, subjectorum, victûs regiminis, & in variis morbi stadiis, diversimodè prorsùs agere: sic ut exindè fluxûs non modò major aut minor, frequentior aut rarior, tardior aut celerior, verùm etiam quoad humoris exeuntis indolem dissimilis appareat; ex his, inquam, probè perpensis, absque ulteriori demonstratione facilè cuivis intelligendum dabitur Diabetem, non uno tantùm, sed multiplici remediorum genere

sanari posse , cum ex diversitate causarum , symptomatum & temperierum , summa subnascatur indicationum varietas , quæ diversam necessariò medendi methodum desiderat.

Quamquam ingenuè fatendum sit quod ubi fluxus Diabeticus ad summum incrementi vigorisque gradum pervenit , ità ut humor qui jugiter excernitur ad stupendam penè mensuram , magnâque prorsùs exeat cum celeritate , nec tantùm crudus , incoctus , pellucidus , sed & lymphaticus , chylosus , pinguisque succus effluat , tùm , inquam , unicam ferè sese offerre indicationem , cum si fluxus hujusmodi tantisper perseveret ultimum immineat vitæ discrimen , seu de subitanea lethaliqve virium dejectione timendum sit. In hoc ergò misero prorsùs rerum statu , etsi vero-simile videatur fluxum Diabeticum ex diversis causis natalitia sua sumpsisse , cum tamen præsens diluvium intensam universæ massæ colliquationem magnamque laxitatem ductuum arguat : tunc iterùm atque iterùm urgentiori succurrendum est , omniaque præsidiorum genera , quam citissimè sunt adhibenda , ut fluxus immoderatus coerceatur , mutuendæque dissolutionis progressus possit cohiberi.

Verùm nec omnes qui sese offerunt Diabetici in eo lugendo prorsùs statu sunt constituti, ut propter abundantiam fluxus, jam propè perituri sint, & aliundè, cùm morbus ad eum vehementiæ gradum pro-
vectus est: certè rem planè desperatam arbitramur; nec inter varias ab Autho-
ribus relatas observationes, quempiam ex Diabeticis sic affectis, evasisse legimus.

Dùm itaque varias indicationes in sanandâ Diabete sese offerre, & idcirco diversi generis remedia competere statuimus, illud hauddubiè de Diabete sanabili, seu in quâ juxtâ diversitatem causarum medendi methodum licet ordinare, debet intelligi.

Ergò jam propiùs ad rem accedentes, ut cura Diabetis ex voto succedat, non modo fluxûs, sed & causarum evidentium & symptomatum indoles, sicut & temperies ægrotantium sedulò debent expendi. Si namque crudus, incoctus, insipidus, pellucidus humor per vias urinarias excernatur, nec ejus copia, licet naturali multò major tamen mensuram assumptorum adeò superat, ut metuendum sit ratione quantitatis, vires intra breve temporis spatium dejectum iri. Deindè verò si constet ex disquisitione causarum evidentium fluxum

hujusmodi propter diuturnam crudorum , acidorum & viscidorum ingluviem supervenisse , temperiesque Diabetici vergat ad melancholicam , & si demùm ex naturâ symptomatum inferre liceat fluxum Diabeticum ab infarctu primarum viarum sanguinis spissitudine , & obstructionibus viscerum ortum suum duxisse , in his , inquam , rerum circumstantiis , certum est tum Emetica , tum Cathartica (quæ tamen ratione fluxûs , & laxitatis viarum , ex adstringentium classe sumenda sunt) deindè verò Martialia , Mercurialia , Cinnabarina , aliaque id genus aperientia , nec non Sale volatili oleoso turgida probè competere.

Quæ quidem methodus non modo ratione , sed & magnorum in arte Virorum observationibus , & autoritatibus potest comprobari , nam HARTMANNUS Diabetis specificum in Marte positum esse censet , & ejusdem essentiam mirè commendat. RULLANDUS mulierem Diabete laborantem Aquâ Chalibæata præsertim se sanavisse testatur. SYDENHAMIUS Diabetem iisdem remediis quibus curatur fluor albus , nimirum Sale volatili oleoso turgidis , cum adstringentibus mixtis , sanari posse dicit. GASSERUS testatur se vidisse Diabeticum

quemdam feliciter sanatum , hoc simplici remedio , Cancris scilicet fluviatilibus pulveratis , Thure , & Saccharo cum potu ordinario simul assumptis. In Pharmacopeis Anglorum FULLERIANA nimirum & BATTÆANA ad Diabetem curandam præscribuntur Hydromel calceum , & Aqua benedicta , tum simplex , tum composita , quorum basis est Aqua calcis post completam ebullitionem probè percolata , & edulcorantibus quibusdam mitigata. VALENTINI Hypecacuanam , Vitriolum album Emeticum , Pulverem martialem , & Cinnabarinum Aquam veronicæ ut & Aquas thermales ad hujusce fluxûs causas expugnandas prædicat. HARRIS infusionem Rhabbarbari , Santalorum ; albi scilicet & citrini , Cardamomi minoris in Vino Canarino celebrat , utpotè cujus ope Diabeticum quemdam perfectè sanaverit. Denique clariss. D. CHIRAC , non modo Martialia , sed & Mercurialia , imò quoque frictions ex Unguento Neapolitano , modo ea quâ decet prudentia adhibeantur , administrari posse constanter asseverat.

Sicque gravissimis , tum rationum , tum observationum & autoritatum ponderibus , evincitur Diabetem à fixitate principiorum

& humorum spissitudine pendentem aperientibus, spirituosis, solventibus, mixtis interim ratione fluxus & laxitatis viarum adstringentibus, sanandam.

Sed ex adversò, si fluxus Diabeticus quoad quantitatem ingens sit & stupendus, respectu verò qualitatis, evidenter pateat chylum, lympham, & pinguedinem, cum serosis humoribus eliminari; si summoperè sitiant, æstuent, ardeant, & exsiccentur Diabetici; & si denique fluxus febribus ardentibus, morbis acutis, & temperamentis biliosis, aut ex diuturno & immoderato salinorum, acrium, piperatorum, & spirituosorum usu, supervenerit; in hoc, inquam, aut consimili rerum statu, cum evidens sit falsedinem, acredinem, & dissolutionem humorum prædominari; certè nemo non intelligit ad lenientia, edulcorantia, incrassantia, mucilaginosam, absorbentia, & adstringentia promptè recurrendum, quæ rursùm methodus præcedentis instar rationis, auctoritatis & experientiæ legibus consentanea, imò multò majori confirmatur observationum numero, ex quibus massam in Diabete sæpiùs, aut magis dissolvi, liquare, quam coagulari colligitur.

I. Siquidem constat ex observationibus

ZACUTI LUSITANI duos Diabeticos solo usu Lactis Asinini Chalybeati, & Philonii perfici per intervalla assumpti, à tanto malo intra unius mensis spatium, aliis incassum adhibitis, feliciter evasisse.

II. ERASTUS eodem in affectu, præsertim usum adstringentium & mucilaginosorum uti Syrupum ex radice Symphiti majoris, & Prunis sylvestribus confectum, nec non decoctum eorundem Prunorum & Corticis interioris Quercûs commendat, quorum videlicet ope Puerum Diabeticum ex voto sanavit.

III. RIVERIUS noster in eundem scopum Narcotica, Syrupum nempè de Papavere, Laudanum Opiatum, cum Syrupis acidis adstringentibus, aliaque id genus censet adhibenda.

IV. Puer Diabeticus apud HILDANUM usu Pulverum adstringentium & lactis Amygdalini, tum & Unguentis Oleisque refrigerantibus & adstringentibus, ejusdem Authoris operâ perfectè fuit liberatus.

V. FULLERUS in Pharmacopœa prælaudata, nixus haud dubiè iteratâ observatione.

1°. Præscribit in fluxu Diabetico decoctum incrassans, cum Gummi Arabico pulverato in Aqua Hordei cocto, addito Syrupode

Althæa paratum. 2°. Emulsionem, quam vocat Arabicam, confectam similiter ex eodem Gummi Arabico, cocto in Aquâ Hordei ad solutionem. Additis dein Seminibus Malvæ, Papaveris albi, Amygdalis dulcibus, Saccharo Saturni, & Syrupo de Althæâ. Demùm & Pulverum ex iisdem confectorum usum consulit.

VI. BLANCARDUS quemdam piissimum Ecclesiæ Pastorem, ope Simplicis decocti ex Malvâ Arboreâ, Lactucâ & Violis, cum non suppeterent alia ex Pharmacopoliis remedia, ab hoc fluxu brevi liberavit.

VII. THEODORUS CRAANEM ad eundem fluxum curandum, præsertim Emulsionibus, Julapiis, & Clysteribus, ex refrigerantibus, nitrosis, & adstringentibus paratis, nec non victu, ad acrimoniam humorum temperandam, idoneo, uti Lacte Amygdalino, Ovis Sorbilibus, Cremoræ Oryzæ, demùm & Unguentis Rosaceo, Populeo, Camphorato, aliisque utendum arbitratur.

VIII. WILLISIUS asserit in Diabete, præsertim Diætâ lacteam convenire, nempe Lac crudum, aut dilutum Aqua Hordei, vel cum Aquâ & Pane albissimo coctum, dein verò Pulveres ex Gummi Arabico, Tragacantha, & Saccharo penidiato, de-

coctum ex Radice Symphiti majoris in lacte, nec non Emulsiões ex decocto Hordei, Radice Nymphaeæ, Amygdalis dulcibus, & Seminibus frigidis confectas, aliaque id genus veluti summè proficua celebrat, quorum videlicet ope nobiliss. quemdam Comitem Diabeticum ab imminente periculo servavit incolumen.

IX. SYLVIVS curam omnem Diabetis in humorum acrimoniâ temperandâ consistere ait, & subjungit, hanc indicationem adimpleri potissimum usu Lactis Vaccini, Asinini, Ovilli, Caprini, muliebris, nec non spiritus salis dulcificati.

X. DOLÆVS ad eundem fluxum expugnandum varia Opii præparata magnificat, præsertimque Laudanum Ribesiatum & Cydoniatum, deindè tincturam Coralliorum, Sulphur Vitrioli, Crocum Martis adstringentem, decocta ex Semine Papaveris albi, Rosis rubris, Radicibus Bistortæ, Tormentillæ, Terram sigillatam, Bolum Armenam, Lapidem Hæmatitem, Aquam & Serum Lactis Chalibæata, fomenta & linimenta ex adstringentibus, verbo, quælibet sanguini consistentiam tribuere, simulque laxatarum partium tonum valent roborare, commendat.

XI. Tandem LISTERVS in Diabete ma-

ximè colliquationi sanguinis occurrendum
usu Lactis , Pomorum , Malorum Puni-
corum , Limoniorum , Ceraforum , Fra-
gorum , nec non ope Diacodii , existimat.

Ex quibus observationibus & authorita-
tum momentis satis superque fit perspicuum
in fluxu Diabetico remedia ad temperan-
dam humorum acredinem , consistentiam
sanguini conciliandam , & vasorum elate-
rem roborandum idonea , frequentius ape-
rientibus , resolventibus ex voto succedere,
maximo dicendi indicio , dissolutionem vi-
gente fluxu sæpius coagulatione prædomi-
nium tenere. Sed neque minus constat ex
ante dictis, interim coagulationem arguen-
dam , eidemque præscriptorum superius ope
medendum esse.

Deniquè quod summa sanè dignum ani-
madversione judicamus , si consulantur at-
tentè variæ prælaudatorum Authorum me-
dendi methodi , de curâ fluxûs Diabetici ,
patebit evidenter , non tantùm in variis
eiusdem morbi differentiis , seu in diversis
subjectis Diabeticis , sed & in unius ejus-
demque Diabetis decursu , nunc aperienti-
bus , Cardiacis & Sale volatili turgidis , mo-
do verò lenientibus , incrassantibus , & hyp-
noticis , intermixtis adstringentibus , imò

quoque variis hisce remediorum generibus simul debitâ proportionē junctis, sic ut se mutuò juvare, seu ad multiplices indicationes adimplendas concurrere valeant, utendum esse, ut mirum prorsus videri possit eorundem artis Procerum monumenta de Diabetis curatione legentibus, quod cum juxtâ præscriptas remediorum formulas diversitatem indicationum agnoscant, unum tamen idemque solūmodo vitium sanguinis, nempe vel coagulationem, vel dissolutionem, arguendum censeant.

Verbo, cum ex adductis hūc usque rationum, observationum, & authoritatum ponderibus, evidenter inferri possit, imò, nostro quidem judicio pateat evidentissimè diversi generis indicationes ad Diabetis curam absolvendam adimplendas. Jure concludimus.

E R G O

Ad sanandam Diabetem diversi generis remedia sunt adhibenda.

